

TIMSKI RAD U REVENCIJI BOLA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U OPŠTOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

Dr Marko Ćurčić, stomatološka ordinacija StarDent

Determinante koje određuju način lečenja deteta

1. Uzrast deteta
2. Tegoba
3. Stomatološki tim

Podela dece prema uzrastu:

1. Mlađi od 2 god. - potpuno zavisni od roditelja
2. Uzrast 2-4 god. - početak osamostaljivanja
3. 4-6 - skoro potpuno samostalni
- počinje smena denticije



Upper Teeth		Erupt	Shed
Central incisor		8-12 mos.	6-7 yrs.
Lateral incisor		9-13 mos.	7-8 yrs.
Canine (cuspid)		16-22 mos.	10-12 yrs.
First molar		13-19 mos.	9-11 yrs.
Second molar		25-33 mos.	10-12 yrs.

Lower Teeth		Erupt	Shed
Second molar		23-31 mos.	10-12 yrs.
First molar		14-18 mos.	9-11 yrs.
Canine (cuspid)		17-23 mos.	9-12 yrs.
Lateral incisor		10-16 mos.	7-8 yrs.
Central incisor		6-10 mos.	6-7 yrs.

Tegoba (plan terapije)

Zavisno od toga da li dete dolazi sa tegobama ili bez njih, razlikuju se dva plana terapije:

1. Preventivni (dete dolazi bez tegoba)
2. Terapijski (dete dolazi sa tegobama)

Preventivni plan

- Potrebno je obaviti detaljan stomatološki pregled, kao i procenu opšteg stanja deteta.
- Uzeti anamnezu o održavanju oralne higijene, navika u ishrani...
- Obuka i motivacija i dece i roditelja
- Biti krajnje strpljiv



Terapijski plan

Usmeren je ka rešavanju tegoba (bol, otok, anomalija).

Najčešće intervencije su:


1. ekstrakcija zuba
2. terapija oboljenja pulpe
3. karijes



Stomatološki tim

Čine ga:

1. Administrator na prijemu
2. Sestra/asistent
3. Roditelj/članovi porodice
4. Stomatolog



Hvala na pažnji 😊